

SEGNALAZIONI
ECOLOGICHE
E FAUNISTICHE

Livio Ruggiero °

RINVENIMENTO DI UN ESEMPLARE DI *HALIOTIS COCCINEA* REEVE SULLA COSTA SALENTINA °°

Nel suo esauriente lavoro sulle *Haliotis* della Provincia Lusitânica, C.L. GARAVELLI (1968) descrive *Haliotis coccinea* REEVE, riportando come areale della specie quello delle « Isole Canarie e zone atlantiche circosvicine », dichiarando di non essere a conoscenza di reperti mediterranei.

Ho recentemente avuto, dal Sig. Giuseppe De Tommasi di Lecce, un esemplare di *Haliotis coccinea*, da lui raccolto, nel 1976, su una spiaggia a pochi chilometri a sud di Lecce, sulla costa adriatica, in località « Le Cesine », una bella e interessante area acquitrinosa separata dal mare da una lunga duna sabbiosa.

Nell'illustrazione (Fig. 1) l'esemplare di *H. coccinea* è mostrato a confronto con un esemplare di *H. lamellosa* LAMARCK, proveniente dallo stesso tratto di costa.

Si noti come in *H. coccinea* la spira si avvolga praticamente su sé stessa, senza traslazione lungo l'asse, come in *H. lamellosa*, conferendo alla conchiglia un aspetto inconfondibile.

L'esemplare misura mm 43,2 di lunghezza per mm 29,7 di larghezza, presentandosi in un ottimo stato di conservazione, tanto da far supporre di aver perduto le parti molli non molto tempo prima del rinvenimento.

E' ovvio che solo il reperimento di esemplari vivi in loco potrà autorizzare la conclusione che *Haliotis coccinea* si è introdotta in Mediterraneo. Per il momento, mancando una qualunque segnalazione di reperti di *H. coccinea* tra Gibilterra e il Canale di Sicilia, l'unica ipotesi plausibile è che l'esemplare in questione sia giunto nella zona di reperimento con qualche nave o peschereccio proveniente dall'Atlantico, probabilmente vivo.

D'altro canto non mi sembra di aver mai visto *H. coccinea* tra le specie normalmente oggetto di vendita sulle bancarelle di souve-

° Stazione di Biologia Marina di Porto Cesareo dell'Università di Lecce.

°° Lavoro accettato il 13 marzo 1981.

nirs, ogni anno sempre più frequenti nelle zone turistiche balneari, a differenza di *Haliotis discus* REEVE, di cui un esemplare di mm 58 per mm 40 è stato rinvenuto, alcuni anni fa, dalla Sig.ra Anita Briganti, socia dell'UMI, sulla spiaggia di S. Foca, un frequentato centro balneare qualche chilometro più a sud della località « Le Cesine ».




Fig. 1 - *Haliotis coccinea* REEVE (a destra) e *Haliotis lamellosa* LAMARCK (a sinistra) da « Le Cesine » (Lecce). x 1,2.
(Foto M. Vantaggiato)

BIBLIOGRAFIA

- GARAVELLI C.L., 1968 - Le *Haliotis* della Provincia Lusitanica. *Conchiglie*, Milano, 4 (5-6) : 93-115, 7 ff.
- SPADA G., MALDONADO QUILES A., 1974 - Nota preliminare sulle specie di molluschi a diffusione prevalentemente atlantica e presenti anche in Mediterraneo nel Mare di Alboran. *Quad. Civ. Staz. Idrobiol. Milano*, 5 : 51-70, tav. 1, tab. 2.