

RINVENIMENTI MALACOLOGICI
------------------------------

**Mauro Doneddu\* & Bruno Manunza\*\***

NOTE SUL RITROVAMENTO DI ALCUNI MOLLUSCHI POCO  
FREQUENTI PER IL LITORALE DI ALGHERO\*\*\*

**Riassunto**

Si segnala il ritrovamento di alcune specie non comuni per il litorale di Alghero (Sardegna Nord-Occidentale) avvenuto in date diverse negli ultimi anni. Per alcune di esse si tratta della prima segnalazione per la Sardegna.

**Summary**

Finding of some uncommon species of molluscs is reported from Alghero (NW Sardinia).

1) *Mitra nigra* (GMELIN in L., 1791) - Specie di infrequente incontro per il Mediterraneo, e particolarmente per le acque italiane.

Un esemplare vivente di 25.3 mm di altezza per 12.6 mm di larghezza, attribuibile al morfotipo individuato come maschile da GIANNUZZI SAVELLI (1984), rinvenuto in località Porto Ferro. Le parti molli corrispondono alla descrizione di SMRIGLIO et al. (1987). Si rimarca la diversità dell'habitat: l'esemplare di P.to Ferro è stato trovato a profondità molto minore, -3 m ca., su roccia affiorante da un fondo sabbioso. Ritrovamento dell'agosto 1981.

2) *Solemya togata* (POLI, 1795) - Tre esemplari integri più numerosi frammenti rinvenuti al Lido di Alghero, spiaggiati su litorale sabbioso fronteggiante una vasta prateria di *Posidonia oceanica*. Per la Sardegna Nord-Occidentale la specie è nota anche per il golfo dell'Asinara in habitat simile.

3) *Cancellaria cancellata* (L., 1767) - Esemplare trovato morto ma con ancora le parti molli in stato di discreta freschezza, dopo violenta mareggiata, in località Poglina; circa 10 km a Sud di Alghero, in acque basse (1-2 m) su fondo roccioso-detritico costiero. Specie nota per l'Italia solo dalle coste meridionali siciliane (GRASSO, 1984). Per quanto ci consta si tratta della prima segnalazione per la Sardegna. Ritrovamento dell'agosto 1981.

\* Via Palau 5, Tempio

\*\* C.P. 313, Sassari

\*\*\* Lavoro accettato il 10 giugno 1989

4) *Cymatium cutaceum* (L., 1767) Specie non infrequente, la si segnala per essere stata rinvenuta nella stessa data e luogo della precedente a conferma del fatto che la citata mareggiata riportò verso costa specie circolatori.

5-11) *Xenophora crista* (KÖNIG, 1825), *Cymatium parthenopeum* (V. SALIS, 1793), *Aporrhais serresianus* (MICHAUD, 1828), *Galeodea thyrrena* (CHEMNITZ, 1789), *Phalium saburon* (BRUGUIÈRE, 1792), *Maetra glauca* (VON BORN, 1778), *Spondylus gussoni* O.G. COSTA, 1829; specie ottenute da pescherecchio operante con reti strascicanti in un raggio di ca. 20 miglia dalla costa di Alghero, su fondi fangosi a circa 100-150 m di profondità. *Spondylus gussoni* fu rinvenuto aderente a madrepora o vasellame impigliati nelle reti.

## BIBLIOGRAFIA

- GIANNUZZI SAVELLI R., 1984 - La superfamiglia Mitroidea nel Mediterraneo. Atti Simposio di Bologna 1982. *Lavori SIM* 21: 67-116.
- GRASSO S., 1984 - I Cancellaridi. Specie viventi nel Mediterraneo e considerazioni sulla loro attuale distribuzione. *La Conchiglia* 16, (188/9): 12-14.
- SMRIGLIO C., MARIOTTINI P., GRAVINA F., 1987 - Segnalazione di *Mitra nigra* (GMELIN in L., 1791) per le isole Pontine. *Boll. Malac.* 23: 322-324.