


Sandro Venturini

RINVENIMENTO DI ESEMPLARE TERATOLOGICO
DI *MUREX BRANDARIS* L.

Nel mese di settembre 1972 venni in possesso di un esemplare mostruoso di *Murex brandaris* L., avuto da pescatori che operavano nella zona antistante Grado, dragato insieme a moltissimi altri esemplari della stessa specie, fra gli 8 e i 12 metri di profondità.

La conchiglia, regolarissima come spira, presenta un doppio canale sifonale, come nell'anomalia che COEN denominò bicaudata, illustrata da F. SETTEPASSI nel fasc. *Murex*, tav 10, fig. 36 dell'Atlante Malacologico. Inoltre entrambi i canali sono improvvisamente dritti verso destra, formando un angolo quasi retto con l'asse conchigliare.



Si tratta quindi di una doppia mostruosità, probabilmente assai rara, perché non descritta da malacologi quali DAUTZENBERG, DE GREGORIO, COEN e SETTEPASSI), che si occuparono attivamente del polimorfismo e delle anomalie di *Murex brandaris*. L'esemplare è stato raccolto vivente e le dimensioni della conchiglia sono le seguenti: h = 68 mm, D = 50 mm.

BIBLIOGRAFIA

- DE GREGORIO A., 1884-1885: Forme, varietà e specie dipendenti dal *Murex brandaris* L. (in Studi su talune conchiglie mediterranee viventi e fossili), Siena : 227-235.
DAUTZENBERG PH., 1904: Variations et cas teratologique chez le *Murex brandaris* L., *Journ. de Conchyl.*, 52 : 287, tav. 8, fig. 5.
COEN G.S., 1937: Nuovo saggio di una *Sylloge Molluscorum Adriaticorum*, R. Com. *Talassogr. Ital.*, Memoria 240, Venezia.
SETTEPASSI F., 1967 - Atlante Malacologico dei Molluschi Marini viventi nel Mediterraneo, Roma, Fasc. *Murex*.